



FIGUR



NOBILIN FETT-CONTROL

Gebrauchsinformation

NOBILIN FETT-CONTROL

Klinisch erprobt

NOBILIN FETT-CONTROL ist ein klinisch erprobtes Fettbinde-mittel, das Lipoxitral, einen patentierten bio-zertifizierten Faserkomplex pflanzlichen Ursprungs, sowie die essentiellen fettlöslichen Vitamine A, D und E enthält. NOBILIN FETT-CONTROL kann nachweislich bis zu 27,4 % der in der Nahrung enthaltenen Fette binden und anschließend den Körper mit den fettlöslichen Vitaminen (dabei trägt die maximale Tagesdosis von 6 Tabletten dazu bei, den empfohlenen Bedarf zu decken) versorgen.

NOBILIN FETT-CONTROL ist ein zertifiziertes Medizinprodukt zur Gewichtskontrolle und zur Prophylaxe und Behandlung von Übergewicht (Adipositas). Sicherheit und Wirksamkeit des Mittels wurden gemäß der Medizinprodukte-Richtlinie 93/42/EWG beurteilt.

Durch die Circadian-Kapseltechnologie ist NOBILIN FETT-CONTROL ein besonderes Fettbindemittel

Bei NOBILIN FETT-CONTROL dient die Circadian-Kapsel-technologie dazu, Lipoxitral und die fettlöslichen Vitamine gezielt nacheinander freizusetzen, um zuerst eine effektive Fettbindung und anschließend eine optimale Vitaminresorption zu gewährleisten. Durch die Circadian-Kapseltechnologie wird Lipoxitral schneller freigesetzt als die essentiellen fettlöslichen Vitamine. Auf diese Weise wird verhindert, dass die fettlöslichen Vitamine in der Fettbindungsphase gebunden werden. In der Fettbindungsphase bindet Lipoxitral die in der Nahrung enthaltenen Fette schnell an sich und bildet einen Fett-Faser-Komplex. Anschließend wird der Fett-Faser-Komplex zu seiner Stabilisierung mit einem Gel umhüllt. Auf diese Weise wird der Komplex auch vor den pH-Wert-Änderungen geschützt, die beim Übergang vom Magen zum Dünndarm auftreten. Da der Fett-Faser-Komplex für die Resorption im Dünndarm zu groß ist, wird er auf natürliche Weise mit dem Stuhl ausgeschieden. Im Anschluss an die Fettbindungsphase werden die essen-tiellen fettlöslichen Vitamine A, D und E freigesetzt und durch Resorption in den Körper aufgenommen. Dadurch wird die Verfügbarkeit von fettlöslichen Vitaminen für die Resorption in den Körper optimiert. Neben seinen fettbindenden Eigenschaften trägt NOBILIN FETT-CONTROL dazu bei, die Esslust und den Appetit zu mindern. Die in diesem Produkt enthalte-nen löslichen Fasern bestehen aus schleimartigen Polysacchariden und schwellen bei Kontakt mit Wasser an, sodass der Durchlauf der Nahrungsstoffe verzögert wird. Auf diese Weise verlangsamt sich die Verdauung und es findet kein rascher Anstieg des Blutzuckerspiegels statt. Müdigkeit und Heißhunger nach Süßigkeiten werden unter Kontrolle gehalten.

Zusammensetzung

1 Tablette enthält: Lipoxitral einen patentierten bio-zertifizierten Faserkomplex pflanzlichen Ursprungs. Hilfsstoffe: Mikrokristalline Cellulose, Tri-Calciumphosphat, Chlorophyllin, Magnesiumstearat, Croscarmellose Natrium Sonstige Inhaltsstoffe: Vitamin A-Acetat (Retinol), Vitamin D₃ (Cholecalciferol) und Vitamin E-Acetat (alpha-Tocopherol)

NOBILIN FETT-CONTROL besitzt ein nachgewiesenes Sicherheitsprofil ohne bekannte Nebenwirkungen. Es enthält keine Zusätze wie künstliche Farbstoffe, Aromastoffe, Salze oder Konservierungsmittel.

Anwendungshinweise

- Direkt nach der Mahlzeit mit etwas Flüssigkeit einnehmen (siehe Dosierungsempfehlungen)
- Die Höchstmenge von 6 Tabletten pro Tag darf nicht überschritten werden
- Nicht empfohlen für Kinder unter 12 Jahren

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

- Während der Schwangerschaft oder Stillzeit sollte dieses Produkt nicht eingenommen werden.
- Falls Ihr Body-Maß-Index (BMI) den Wert von 18,5 unterschreitet, sollten Sie dieses Produkt nicht einnehmen.
- Es ist empfehlenswert, einen Zeitabstand von 2 Stunden zwischen der Einnahme dieses Produktes und fettlöslichen Medikamenten wie beispielsweise orale Kontrazeptiva (Antibabypille) einzuhalten.
- Dieses Produkt enthält Spuren von Oxalsäure, die auch in vielen anderen grünen Gemüsen vorkommt. Falls Sie an einer Nierenerkrankung oder Nierensteinen leiden, sollten Sie die regelmäßige Einnahme dieses Produkts vermeiden.
- NOBILIN FETT-CONTROL enthält Vitamin A (Retinol). Dieses Produkt sollte nicht eingenommen werden
 - wenn Sie schwanger oder wahrscheinlich schwanger sind
 - wenn Sie einmal in der Woche Leber oder leberhaltige Produkte essen und zusätzlich Vitamin A-reiche Nahrungsmittel zu sich nehmen
 - wenn Sie ein erhöhtes Osteoporose-Risiko haben
- Bitte wenden Sie sich vor der Einnahme von NOBILIN FETT-CONTROL an einen Arzt oder Apotheker, falls Sie
 - Diabetiker sind, weil dieses Produkt die Esslust durch Ausgleich des Blutzuckerspiegels reduziert. Diabetiker müssen möglicherweise die tägliche Diabetesbehandlung anpassen, um einen hypoglykämischen Anfall (Insulinschock) zu verhindern
 - cholesterinsenkende Medikamente anwenden



FIGUR



NOBILIN FETT-CONTROL

- bei Ihnen ein medizinisch relevanter Zustand besteht
 Hinweis: Gemäß der Medizinprodukte-Richtlinie 93/42/EWG sollten Sie nach 30 Tagen der Einnahme dieses Medizinproduktes eine Ruhephase von 3-5 Tagen einhalten.

Lagerung

- Für Kinder unzugänglich aufbewahren
- An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren
- Mindesthaltbarkeitsdatum: siehe Packung und Blisterstreifen

Dosierungsempfehlungen

Um den besten Nutzeffekt mit NOBILIN FETT-CONTROL zu erreichen, empfehlen wir Folgendes:

Was möchten Sie erreichen?	Unsere Empfehlung
Körpergewicht senken	<ul style="list-style-type: none"> - Nehmen Sie nach jeder Hauptmahlzeit 2-3 Tabletten NOBILIN FETT-CONTROL ein - Nach fettreichen Mahlzeiten können Sie 3 Tabletten einnehmen
Bestehendes Körpergewicht beibehalten und das allgemeine Wohlbefinden verbessern	<ul style="list-style-type: none"> - Nehmen Sie nach jeder Hauptmahlzeit 1-2 Tabletten NOBILIN FETT-CONTROL ein - Nach fettreichen Mahlzeiten können Sie 2-3 Tabletten einnehmen

Hinweis

Es wird empfohlen pro Tag höchstens 6 Tabletten einzunehmen. Die Einnahme von NOBILIN FETT-CONTROL ist ein wichtiger Schritt zur Gewichtskontrolle und wirkt am besten in Verbindung mit einem Gesamtplan zur Kontrolle des Körpergewichts. Eine effektive Gewichtskontrolle erfordert eine langfristige Perspektive und sollte in Verbindung mit einem Ernährungsplan und einem aktiven Bewegungsprogramm sowie einer gesunden Lebensweise umgesetzt werden.

Beurteilung des Bedarfs für eine Reduktion des Körpergewichts

Gemäß der Klassifikation der Weltgesundheitsbehörde (WHO) dienen drei Hauptparameter zur Beurteilung des Körpergewichts: der Body-Maß-Index (BMI), der Taillenumfang und Risikofaktoren für Erkrankungen und Zustände, die mit Fettleibigkeit verbunden sind.

Body-Maß-Index (BMI)

Der BMI ist ein zuverlässiges Maß für das Gesamtkörperfett. Es besteht ein Zusammenhang zwischen diesem Wert und dem Erkrankungsrisiko.

Body-Maß-Index (BMI) = Körpergewicht (in Kilogramm) : Körpergröße (in Metern)²

BMI < 18,5 kg /m ²	Untergewicht	Gewichtszunahme wird empfohlen
BMI 18,5 - 24,9	Normalgewicht	Es ist wichtig, das Gewicht zu halten
BMI 25,0 - 29,9	Übergewicht	Gewichtsreduktion oder zumindest keine weitere Zunahme des Körpergewichts wird empfohlen
BMI 30,0 kg /m ² oder höher	Fettleibigkeit	Gewichtsreduktion zur Verbesserung des Gesundheitszustands wird empfohlen

Der BMI gilt bei Männern und Frauen gleichermaßen, aber es gibt einige Einschränkungen:

- Bei Sportlern und sonstigem muskulösen Körperbau kann der Körperfettanteil zu hoch geschätzt werden
- Bei Senioren und Menschen mit reduzierter Muskelmasse kann der Körperfettanteil unterschätzt werden

Taillenumfang

Bestimmen Sie den Taillenumfang mit einem Maßband, das eng an der Taille anliegt. Der gemessene Wert ist ein gutes Maß für den Bauchfettanteil, der als weiterer wichtiger Indikator für das Risiko von Herzerkrankungen und anderen gewichtsabhängigen Krankheiten angesehen wird.

Taillenumfang	Risiko	
	Erhöhtes Risiko	Hohes Risiko
Männer	94 cm	über 102 cm
Frauen	80 cm	über 88 cm

Vertrieb

MEDICOM Pharma GmbH
 Schorner Str. 1A
 82065 Baierbrunn

Hersteller

DISTRICON GmbH
 Am Joseph 15
 61273 Wehrheim

CE 0297

Stand der Information

Januar 2011

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Produktinformationen wünschen, stehen Ihnen die Mitarbeiter unserer wissenschaftlichen Abteilung gern zur Verfügung. Wählen Sie einfach die gebührenfreie Nummer:

Tel.: **0800 - 73 77 730**

Fax: **0800 - 73 77 700**

www.medicom.de

REV 02

MEDICOM®