



# NOBILIN FETT-BLOCKER

## Gebrauchsinformation

Bitte lesen Sie vor der Einnahme von NOBILIN FETT-BLOCKER diese Gebrauchsinformation aufmerksam durch.

### Anwendungsgebiet

Fettbinder zur Unterstützung einer Reduktionsdiät bei Übergewicht bzw. zur Gewichtskontrolle im Rahmen einer fettbewussten Ernährung.

### Inhalt und Menge

Packung zu 60 Tabletten mit 510 mg Feigenkaktuspulver.

### Was ist NOBILIN FETT-BLOCKER?

NOBILIN FETT-BLOCKER ist ein Medizinprodukt mit hoher Bindungsaffinität für Fette in der Nahrung. Es enthält Feigenkaktuspulver, einen aus Pflanzen gewonnenen Faserkomplex aus *Opuntia ficus-indica*.

### Anwendung und Dosierung

- Zur Gewichtskontrolle im Rahmen einer fettbewussten Ernährung
- Prophylaxe und Behandlung von Übergewicht, insbesondere Unterstützung einer fettreduzierten Diät durch:
  - Verminderung der Fettaufnahme aus der Nahrung
  - Verminderung der Kalorienaufnahme aus Nahrungsfetten
  - Verlängerung des Sättigungsgefühls nach einer Mahlzeit

Dosierung: 1-3 Tabletten zu den Mahlzeiten, max. 9 Tabletten pro Tag

### Wer soll NOBILIN FETT-BLOCKER anwenden?

Erwachsene Personen mit Body-Mass-Index (BMI) > 25.

Erwachsene Personen mit BMI 18,5 bis 24,9 in Zeiten unvermeidlich hoher Fetteinnahme.

### Wann soll NOBILIN FETT-BLOCKER nicht angewendet werden?

Kinder unter 12 Jahren, Jugendliche, Schwangere, Stillende und Personen mit Untergewicht (BMI < 18,5) sowie Personen mit entzündlichen Magen-Darm-Erkrankungen sollten NOBILIN FETT-BLOCKER nicht anwenden.

### Vorsichtsmaßnahmen

Es wird empfohlen zwischen der Einnahme von NOBILIN FETT-BLOCKER und oralen Kontrazeptiva, fettlöslichen Arzneimitteln oder Vitaminpräparaten einen Abstand von ca. 2 Stunden einzuhalten.

Nach 30 Tagen kontinuierlicher Einnahme eine Pause von 3-5 Tagen einlegen.

### Warnhinweise

NOBILIN FETT-BLOCKER Tabletten enthält Spuren von Oxalsäure, welche natürlicherweise in zahlreichen grünen Gemüsesorten vorkommt. Bei Nierenerkrankungen oder Nierensteinen sollte dieses Produkt deshalb nicht regelmäßig eingenommen werden.

NOBILIN FETT-BLOCKER kann indirekt den Blutzuckerspiegel beeinflussen. Diabetiker müssen evtl. ihre Behandlung mit Hilfe des Arztes anpassen, um eine Hypoglykämie zu vermeiden.

Im Zweifel, oder wenn cholesterinsenkende Mittel oder andere Arzneimittel eingenommen werden, soll vor Einnahme dieses Medizinproduktes ein Arzt oder Apotheker konsultiert werden.

### Nebenwirkungen

In seltenen Fällen kann es vorübergehend zu Völlegefühl und Blähungen kommen.

Falls Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten (wie z.B. Hautausschläge, Juckreiz, leichte Schwellungen, leichte Magen-Darm-Störungen) sollte die Anwendung abgebrochen werden.



## Zusammensetzung

Funktioneller Bestandteil: Feigenkaktuspulver.  
Hilfsstoffe: mikrokristalline Cellulose, Sorbitol\*, Cellulosepulver, Magnesiumstearat, Natriumstärkeglykolat, Siliciumdioxid, Überzug (HPMC, HPC, Talkum, Stärke, MCT).

\* kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.

## Lagerung



Kühl, trocken und außer Reichweite von Kindern aufbewahren.



Verwendbar bis: siehe Angaben auf der Verpackung.

## Hersteller

Acopan AG  
Industriestr. 11  
CH-9524 Zuzwil

## Vertrieb

Medicom Pharma GmbH  
Feringastr. 4  
85774 Unterföhring

CE 0481

GP2017/5,5

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Produktinformationen wünschen, stehen Ihnen die Mitarbeiter unserer wissenschaftlichen Abteilung gern zur Verfügung. Wählen Sie einfach die gebührenfreie Nummer:

Tel.: **0800-73 77 730** Fax: **0800-73 77 700**

Online: **www.medicom.de**

Informationsstand  
März 2017

  
**MEDICOM®**